KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET

Remiss: PREFAB Fetal typning NGS

Bestämning av fostrets erytrocyttyp (alt. trombocyttyp) hos immuniserade gravida kvinnor

Remiss klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Beställare Kombikakod	Patientidentitet Personnummer/reservnummer
Remitterande läkare	Plats för laboratoriets etikett
Provtagningstid År / Mån / Dag / Timme / Minut	Den som tagit provet ska med sin namnunderskift intyga att identitetskontroll på patienten är utförd och att märkning av rör och remiss stämmer överens med patientens identitetsuppgifter (enlig SOSFS). Provtagarens namnunderskrift
Beräknad partus: Enligt SM ☐ UL ☐ el BP ☐ Duplex ☐ja ☐nej ☐okänt Paritet:	Klinisk information (typ av immunisering, graviditetsvecka vid provtagning, genomgått behandling med transplantation?)
Prov skickas till: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Transfusionsmedicin C2:58 141 86 STOCKHOLM	

Provtagning

Blodprov tas tidigast i graviditetsvecka 10. Tas provet tidigare finns risk för för låg koncentration fetalt DNA.
Skriv moderns fullständiga namn och personnummer alt. reservnummer.
Socialstyrelsens föreskrifter för provtagning till blodgruppering ska följas.
Provet får ej öppnas efter provtagning p.g.a. risk för kontamination.
1 st EDTA-rör, lila propp á 7 mL. Rören ska vara välfyllda.

Transport och svar

Blodprovet bör inte vara äldre än 5 dygn när det anländer till Transfusionsmedicin.
Svar ges inom 4 veckor.

Vid frågor kontakta Studiekoordinator Mari Flodström 072 5841693

Utgiven 2026-10-05